

Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (gatunki docelowe)*

Rodzina	Gatunek docelowy dzikich ptaków
Kaczki, gęsi i łabędzie (<i>Anatidae</i>)	czernica (<i>Aythya fuligula</i>) ogorzałka (<i>Aythya marila</i>) głowienka (<i>Aythya ferina</i>) hełmiatka (<i>Netta rufina</i>) rożeniec (<i>Anas acuta</i>) świstun (<i>Mareca penelope</i>) cyranka (<i>Anas querquedula</i>) płaskonos (<i>Spatula clypeata</i>) krakwa (<i>Mareca strepera</i>) krzyżówka (<i>Anas platyrhynchos</i>) cyraneczka (<i>Anas crecca</i>) nurogęś (<i>Mergus merganser</i>) szlachar (<i>Mergus serrator</i>) gągoł (<i>Bucephala clangula</i>) bielaczek (<i>Mergellus albellus</i>) edredon (<i>Somateria mollissima</i>) uhla (<i>Melanitta fusca</i>) markaczka (<i>Melanitta nigra</i>) lodówka (<i>Clangula hyemalis</i>) ohar (<i>Tadorna tadorna</i>) gęsiówka egipska (<i>Alopochen aegyptiacus</i>) gęś mała (<i>Anser erythropus</i>) gęgawa (<i>Anser anser</i>) gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>) gęś tundrowa (<i>Anser rossicus</i>) bernikla kanadyjska (<i>Branta canadensis</i>) gęś krótkodzioba (<i>Anser brachyrhynchus</i>) bernikla białolica (<i>Branta leucopsis</i>) bernikla obrożna (<i>Branta bernicla</i>) gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>) łabędź czarnodzioby (<i>Cygnus columbianus</i>) łabędź krzykliwy (<i>Cygnus cygnus</i>) łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>)
Perkozowe (<i>Podicipedidae</i>)	zausznik (<i>Podiceps nigricollis</i>)

	perkoz rdzawoszyi (<i>Podiceps ruficollis</i>)
	perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>)
	perkozek (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)
Bociany (<i>Ciconiidae</i>)	bocian biały (<i>Ciconia ciconia</i>)
Czaplowate (<i>Ardeidae</i>)	bąk (<i>Botaurus stellaris</i>)
	czapla nadobna (<i>Egretta garzetta</i>)
	czapla biała (<i>Egretta alba</i>)
	czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>)
Kormorany (<i>Phalacrocoracidae</i>)	kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)
Ptaki drapieżne (<i>Accipitridae, Falconidae, Strigidae</i>)	bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>)
	rybołów (<i>Pandion haliaetus</i>)
	błotniak stawowy (<i>Circus aeruginosus</i>)
	myszołów włochaty (<i>Buteo lagopus</i>)
	myszołów (<i>Buteo buteo</i>)
	pustułka (<i>Falco tinnunculus</i>)
	sokół wędrowny (<i>Falco peregrinus</i>)
	jastrząb (<i>Accipiter gentilis</i>)
	krogulec (<i>Accipiter nisus</i>)
	uszatka (<i>Asio otus</i>)
	puszczyk (<i>Strix aluco</i>)
	puchacz (<i>Bubo bubo</i>)
Łyski, derkacze i chruściele (<i>Rallidae</i>)	wodnik (<i>Rallus aquaticus</i>)
	kokoszka (<i>Gallinula chloropus</i>)
	łyska (<i>Fulica atra</i>)
Bekasowate (<i>Scolopacidae</i>)	samotnik (<i>Tringa ochropus</i>)
	ostrygojad (<i>Haematopus ostralegus</i>)
	sieweczka obrożna (<i>Charadrius hiaticula</i>)
	sieweczka rzeczna (<i>Charadrius dubius</i>)
Mewy, rybitwy i podobne (<i>Laridae</i>)	mewa siodłata (<i>Larus marinus</i>)
	mewa srebrzysta (<i>Larus argentatus</i>)
	mewa białogłówka (<i>Larus cachinnans</i>)
	mewa czarnogłówka (<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>)
	mewa siwa (<i>Larus canus</i>)
	śmieszka (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)
	rybitwa rzeczna (<i>Sterna hirundo</i>)

	rybitwa białoczelnia (<i>Sternula albifrons</i>)
	rybitwa czubata (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)
Krukowate (<i>Corvidae</i>)	sroka (<i>Pica pica</i>)
	kawka (<i>Coloeus monedula</i>)
	gawron (<i>Corvus frugilegus</i>)
	wrona siwa (<i>Corvus cornix</i>)
	kruk (<i>Corus corax</i>)
Drozdy (<i>Turdidae</i>)	kwiczoł (<i>Turdus pilaris</i>)
	kos (<i>Turdus merula</i>)
	śpiewak (<i>Turdus philomelos</i>)
Kurowate (<i>Phasianidae</i>)	bażant (<i>Phasianus colchicus</i>)
Gołębiowate (<i>Columbidae</i>)	grzywacz (<i>Columba palumbus</i>)
	sierpowka (<i>Streptopelia decaocto</i>)

*Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – 2023 r.